

conill (ZOO)

(*Oryctolagus cuniculus*, família dels lepòrids)
Mamífer de l'ordre dels lagomorfs més petit i arrodonit que la llebre, amb les orelles més curtes i sense les taques negres. Pot arribar a córrer a una velocitat de 40 km/h. Adopta una coloració marronosa o grisenca. Té la cua curta i de color negre o fosca i blanca per sota. Ocupa diversos hàbitats, preferentment, terrenys oberts camps abandonats o matorrals, i també clarianes o varades de boscos. Necessita un sòl argilós o arenós on poder excavar-hi el cau. Adopta hàbits crepusculars i nocturns, amb els

màxims d'activitat a la posta i a l'alba, encara que també se'l pot veure de dia. Construeixen caus on creixen les cries. La pràctica agrícola moderna n'ha afavorit l'expansió per l'augment d'hàbitats adequats i l'eliminació de depredadors. Actualment, hi ha una certa recuperació de les poblacions després d'haver generat certa resistència a la mixomatosi. És un animal herbívor, encara que pot menjar també restes animals. El seu cicle reproductiu té lloc de desembre-gener fins a juny-juliol. La gestació té una durada de trenta dies, més curta a més latitud, i nombre d'embrions variable.

Diccionari de
Benidorm